

Service émetteur : Prévention et gestion
des alertes sanitaires

Mmes et Messieurs les médecins généralistes

Affaire suivie par : DrNAVEL Anne-Marie

Médecins urgentistes

Courriel : anne-marie.navel@ars.sante.fr

des départements de l'Ariège et Haute-Garonne

Téléphone : 05 34 30 26 22

Télécopie : 05 34 30 26 17

Réf. :

Date : 15/12/2010

Objet : Information des médecins sur alerte Listéria

Information des médecins sur alerte « listéria »

Un lot de boudin à la viande (sous vide) fabriqué par la charcuterie SARL André CAZAUX de Lorp Sentaraille (09), suite à la mise en évidence de la présence de listéria monocytogenes, a été retiré de la vente.

Ce produit a été distribué sur 2 départements de la région Midi-Pyrénées : l'Ariège et la Haute-Garonne.

L'ARS Aquitaine a été informée ce jour, ce produit ayant été distribué également sur le département du Lot et Garonne.

La date de péremption (DLC) du produit est le 7 décembre 2010.

Il est possible que vous soyez amenés à voir en consultation des personnes présentant des symptômes de listériose.

La **listériose**, maladie rare mais grave, est due à une infection par *Listeria monocytogenes* dont la transmission se fait principalement par ingestion d'aliments contaminés (fromages au lait cru, charcuterie cuite, poissons crus,). La **durée d'incubation** moyenne est de 3 semaines et s'étend de 3 jours à 2 mois.

Les **personnes à risque** sont les immunodéprimés, les femmes enceintes, les nouveau-nés, les personnes âgées.

Les **symptômes** peuvent être limités à une fièvre isolée, ou avec des formes plus graves neurologiques (méningite, méningo-encéphalite avec des signes d'atteinte du tronc cérébral : paralysie faciale périphérique, paralysie oculomotrice, etc.). Chez la femme enceinte, la listériose ressemble à une grippe (fièvre accompagnée ou non de courbature et de maux de tête). Pendant le premier semestre de la grossesse, la listériose peut provoquer des avortements spontanés. Entre le 6ème et le 8ème mois de grossesse, le nouveau-né peut naître prématurément et parfois est mort-né.

Le **traitement** de la listériose par antibiotique adapté doit être instauré le plus précocement possible.

Pour le Directeur Général de l'Agence Régionale
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint

Jean-Luc LEBEUF