

Service émetteur : Prévention et gestion
des alertes sanitaires

Mmes et Messieurs les médecins généralistes

Affaire suivie par : Dr Maguy TAVE-JEANNIN

Médecins urgentistes

Courriel : maguy.tave-jeannin@ars.sante.fr

des départements du Tarn, du Tarn et Garonne
et Haute-Garonne

Téléphone : 05 34 30 26 32

Télécopie : 05 34 30 26 17

Réf. :

Date : 01/12/2010

Objet : Information des médecins sur alerte Listéria

Information des médecins sur alerte « listéria »

Un lot de pâté de canard (sous vide) de la conserverie de Pignols (Moissac, 82), suite à la mise en évidence de la présence de listéria monocytogenes, a été retiré de la vente.

Ce produit a été distribué sur 3 départements : le Tarn, le Tarn et Garonne et la Haute-Garonne

La date de péremption (DLC) du produit la plus extrême est le 3 décembre 2010.

Il est possible que vous soyez amenés à voir en consultation des personnes présentant des symptômes de listériose.

La **listériose**, maladie rare mais grave, est due à une infection par *Listeria monocytogenes* dont la transmission se fait principalement par ingestion d'aliments contaminés (fromages au lait cru, charcuterie cuite, poissons crus, ...). La **durée d'incubation** moyenne est de 3 semaines et s'étend de 3 jours à 2 mois.

Les **personnes à risque** sont les immunodéprimés, les femmes enceintes, les nouveau-nés, les personnes âgées.

Les **symptômes** peuvent être limités à une fièvre isolée, ou avec des formes plus graves neurologiques (méningite, méningo-encéphalite avec des signes d'atteinte du tronc cérébral : paralysie faciale périphérique, paralysie oculomotrice, etc.). Chez la femme enceinte, la listériose ressemble à une grippe (fièvre accompagnée ou non de courbature et de maux de tête). Pendant le premier semestre de la grossesse, la listériose peut provoquer des avortements spontanés. Entre le 6ème et le 8ème mois de grossesse, le nouveau-né peut naître prématurément et parfois est mort-né.

Le diagnostic peut se confirmer par l'isolement de la bactérie dans le sang, le LCR, le liquide amniotique, le placenta,

Le **traitement** de la listériose par antibiotique adapté doit être instauré le plus précocement possible.

Pour le Directeur Général de l'Agence Régionale
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint,


Jean-Luc LEBEUF

N. B. : Ce courrier s'adresse, sur la Haute-Garonne, prioritairement aux médecins du secteur Nord du département.